

CEFTOCIDIN SECADO®

COMPOSICIÓN

- Cefalexina monohidrato.....2,00 g.
- Neomicina sulfato.....1,00 g.
- Penicilina G procaína.....6,00 g.
- Excipiente oleoso c.s.p.....100,00 ml.

ACCIÓN

Antibiótico tópico intramamario para el período de secado.

INDICACIONES

Está indicado para el secado curativo (mastitis subclínicas) o profiláctico de la ubre.

Cefalexina: es una cefalosporina de amplio espectro, que presenta como características fundamentales:

- a) La mayor tasa de biodisponibilidad de todos los antibióticos, dentro de la glándula mamaria, debido a su baja unión con las proteínas de la leche y a su gran poder de penetración-absorción, llegando en altas concentraciones al foco infeccioso.
- b) Es antibiótico bactericida altamente eficaz contra los mayores patógenos de la glándula mamaria: estafilococos, estreptococos, coliformes y, en especial, contra las cepas frecuentemente resistentes a las penicilinas naturales y sintéticas (ampicilina, cloxacilina) macrólidos y lincosamidas.
- c) Se trata de un antibiótico que no crea fácilmente resistencia frente a un uso sostenido.

Por todo esto, ejerce su accionar durante las primeras 12 a 24 hs, destruyendo los focos infecciosos enquistados profundos.

Penicilina G procaína: Antibiótico de muy alta eficacia contra gérmenes Gram (+), que se caracteriza por perdurar durante tres semanas en el tejido mamario. Su elevado porcentaje de ionización y su bajísimo grado de liposolubilidad le otorgan el carácter de muy lenta difusión.

Neomicina sulfato: Antibiótico que, suspendido en una base de lenta liberación, se caracteriza por perdurar durante toda la fase de secado.

Vale destacar que los tres antibióticos muestran un efecto sinérgico.

La base, de lenta liberación, es completamente inocua para el tejido mamario. La misma fue evaluada en vacas lecheras nodrizas sanas a mitad de lactancia. En ningún caso se observaron cambios en el conteo celular pre y post inoculación de **CEFTOCIDIN Secado**[®] (Laboratorio FUNDACION, Datos no publicados).

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN

Vía intramamaria, adecuando las condiciones de asepsia.

Se recomienda el uso rutinario de **CEFTOCIDIN Secado**[®] en todas las vacas que inician el período de secado. Su beneficio incluye el aspecto profiláctico, ya que evita infecciones durante ese lapso y minimiza los riesgos de la próxima lactancia, ejerciendo, además, una muy importante acción curativa de mastitis subclínicas.

En estas circunstancias se realiza la meticulosa higiene de los pezones. Por tratarse de un PRODUCTO ESTERIL, recién en ese momento debe eliminarse el inyector de su envoltorio y, tras desechar el tapa cánula, aplicar un *“inyector con anillos de flexión”* en cada cuarto. Se aconseja no tocar la cánula estéril para evitar su contaminación.

ADVERTENCIA


Tiempo de espera antes de enviar a faena, 45 días. El período mínimo de secado es de 45 días, que junto al descarte calostrual (siete días mínimos), asegura la ausencia de residuos. En caso de acortar el período debe constatarse la ausencia de residuo de antibiótico posterior al descarte calostrual.

PRESENTACIÓN

CEFTOCIDIN Secado[®] se presenta en cajas atérmicas conteniendo 20 inyectores ESTERILES.

El "inyector con anillos de flexión", patente de Laboratorio FUNDACIÓN, evita que se lastime el conducto del pezón, por más fuerte o brusco que sea su introducción.

Inyector con anillos de flexión



NO RASPA
NO PUNZA

SE DOBLA.

NO lesiona la mucosa del pezón.

Cada inyector se halla dentro de un envoltorio hermético cuyo material preserva su esterilidad.

Producto Irradiado en Comisión Nacional de Energía Atómica.

Venta bajo receta.

Información técnica detallada se encuentra a disposición del Médico Veterinario.

ESTE ES UN MEDICAMENTO BASADO EN INVESTIGACION ORIGINAL DE LABORATORIO FUNDACION. ES LA PRIMERA CEFALEXINA INTRAMAMARIA DESARROLLADA EN MEDICINA VETERINARIA EN AMÉRICA (1986 -1990).

CERT. SENASA Nº 90208

U.REV: 01/2016

LABORATORIO FUNDACION
Avelino Díaz 2535/33
INFO@LABFUNDACION.COM.AR



TEL: 4633-2794/5227
Buenos Aires - Argentina
WWW.LABORATORIOFUNDACION.COM