

PARTONHEL E PASTA®

COMPOSICIÓN

- Pirantel Pamoato.....47.75 g.
- Metrifonato.....43.48 g.
- Excipiente c.s.p.....100 g.

ACCIÓN

Endoparasitocida de amplio espectro para equinos.

PARONHEL- E® ejerce su acción en forma ideal, **actuando en el 95%** de eficacia. Ello lo ubica en un rango ideal, ya que **permite conservar una pequeña carga** que **mantiene la inmunidad del huésped** (más importante aún en potrillos), **impidiendo infestaciones masivas** tan comunes luego del uso sostenido con Ivermectina.

La acción es sobre la musculatura del parásito, provocando una contracción irreversible (parálisis espástica).

El mecanismo de acción sería homólogo al del neurotransmisor acetilcolina en su efecto nicotínico, estando centrado su ataque en la unión neuromuscular (placa mioneural). Posiblemente se trate de una unión de tipo irreversible (contraria a la del neurotransmisor), con los receptores nicotínicos colinérgicos ya que su acción es bloqueada al igual que la acetilcolina por la D-tubocurarina (relajante neuromuscular periférico). Su efecto se extiende también sobre la acetilcolinesterasa por medio de la acción del metrifonato, que le otorga un aumento del espectro hacia gasteróphilus (gusano de cuajo).

INDICACIONES

Para el control eficaz de las siguientes parasitosis, en todos sus estadios:

- **Nematodos:**
 - Ascariasis: (*Parascaris equorum*).
 - Estrongilosis: Grandes Estrongilos (*S. vulgaris*; *S. equinus*; *S. edentatus*). Pequeños Estrongilos.
 - Oxiuros: (*Oxiurus equi*).
- **Cestodos:** *Anaplocephala* sp. y *Paranaplocephala* sp.
- **Gastrofilosis:** *Gasterophilus* (gusano de cuajo)

PARONHEL- E[®] es el único antiparasitario que actúa contra tenías equinas (*Cestodes*) en forma efectiva y reproducible.

No crea acostumbramiento, siendo además altamente eficaz contra parásitos resistentes a los bencimidazoles (mebendazole, oxibendazole), probencimidazoles (febantel), fenotiazina y avermectinas.

POSOLOGÍA

Para suministrar **PARONHEL- E[®]** no se requiere ayuno previo; no interfiere con el trabajo y/o entrenamiento.

El aplicador se suministra con un tope que permite dosificar 250, 500 y 750 kg. Además posee una escala en la cual una medida (una raya de la escala) corresponde a la dosis para 100 kgpv. (equivalente a 4 cc/100 kgpv.). Si se utilizan sólo algunas dosis, el producto debe conservarse dentro de la caja original.

PARONHEL- E[®] posee un alto margen terapéutico. Es completamente atóxico para la yegua preñada, el semental y el potrillo lactante.

ADVERTENCIA

No es aconsejable el uso concomitante con depresores del Sistema nervioso central ni relajantes musculares.

En humanos: Por ingestión accidental recurrir en forma rápida y con el envase del producto al médico más cercano. Antídoto: atropina.

Restricciones de uso: Los animales tratados no deben ser destinados a consumo humano.

CONTRADICCIONES

No posee.

PRESENTACIÓN

PARONHEL- E® pasta se presenta en envases atérmicos conteniendo un aplicador oral con dos dosis para 500 kgpv. (1.000 kg totales), graduado cada 100 kgpv y con tope de escala a los 250, 500 y 750 kgpv.

Venta bajo receta.

Información técnica detallada se encuentra a disposición del Médico Veterinario.

CERT. SENASA Nº 88026

U.REV: 01/2016



CIENCIA Y TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA

LABORATORIO FUNDACION
Avelino Díaz 2535/33
INFO@LABFUNDACION.COM.AR



TEL: 4633-2794/5227
Buenos Aires - Argentina
WWW.LABORATORIOFUNDACION.COM