

Thermo®

COMPOSICIÓN

Cada 100 ml contiene:


- Altrenogest.....0,22 g
- Vehículo oleoso c.s.p.

ACCIÓN

Progestágeno sintético para yeguas.

INDICACIONES

Thermo® se halla indicado para regularizar el estro en la etapa de transición post invernada, cuando está presente a nivel ovárico, un folículo de 15 a 20 mm, detectable por palpación o ecografía. Debe ser administrado durante 14 días y el día 15 se aplica prostaglandina F2 α (PG F2 α), mostrándose el día 17- 18 la reaparición del estro.



Otra indicación es la sincronización del estro en yeguas cíclicas y como mejorador del tono uterino y conservador de la gestación en yeguas con sospecha de insuficiencia lútea primaria y/o secundaria, la que deberá ser confirmada con dosaje de progesterona.

En casos de yeguas gestantes que padezcan cólico, endotoxemia, infosura, pododermatitis, dolor crónico, trasportes a largas distancias, etc. se crea la posibilidad de liberar alta dosis de prostaglandina F_{2α} (PG F_{2α}) endógena que induce a la luteólisis con reducción de la producción de progesterona y sus consecuencias. **Thermo**[®] es una indicación adecuada de reemplazo del posible déficit de progesterona endógena en estos casos.

Thermo[®] es una herramienta farmacológica para anular el estro y lograr el cierre del cervix, una vez producida la ovulación, cuando aún continúa manifestándose la sintomatología del celo. En yeguas o potrancas en alta competencia, **Thermo**[®] anula el celo al comienzo del mismo, objetivo que se logra 36 a 48 hs posteriores al comienzo de su suministro. La administración de **Thermo**[®] no sólo suprime el estro, sino que estabiliza las variaciones hormonales que ocurren durante el mismo, y bloquea los efectos adversos del celo en las potrancas en competencia.

Ventajas del uso de **Thermo**[®] sobre las progesteronas inyectables:


1. Su uso, no interfiere con los valores de progesterona endógena (de origen luteal), y por ello, durante su administración, es posible realizar el dosaje sérico seriado de esta hormona, para detectar su retorno a la normalidad y suspender la medicación.
2. **Thermo**[®], puede ser administrado con sencillez, y por un método no invasivo.
3. **Thermo**[®] no produce inflamaciones o abscesos que inutilicen al animal para el entrenamiento o el trabajo.
4. **Thermo**[®] es óptimo en yeguas y potrancas en training por lo ya mencionado.

Las yeguas tratadas no ven afectada su fertilidad.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN

Vía oral.

La dosis es de 0,044 mg de altrenogest por kg 1 vez por día aproximadamente a la misma hora. Una medida de 10 ml es la dosis para una yegua de 500 kg, cargándose con una jeringa cortando el pico del envase y siguiendo los pasos como se indica a continuación:



Es importante evitar subdosificaciones por derrames durante el suministro. De ser necesario, **Thermo**[®] puede administrarse hasta los 180 días de gestación (cuando la progesterona sérica se halla por debajo de los valores medios normales: 4 ng/ml), momento en el cual, comienza a intervenir la progesterona placentaria. (1)

1. Ladaga GJB, Ferraro G, Pont-Lezica F, Iribarren P, de Erausquin G.; Comparativa del efecto clínico de dos formulaciones de altrenogest en yeguas SPC en producción; 14TH Cong W.E.V.A.; Guadalajara, Mexico; (8 – 10 Oct; 2015)

EFECTOS COLATERALES

Altrenogest puede aumentar la reacción ventilatoria de los centros respiratorios al CO₂ conduciendo a una reducción de presión parcial de dicho gas (Pco₂) arterial y alveolar. Puede generar somnolencia por cierta acción depresora del SNC. Pueden modificar los valores de insulina.

ADVERTENCIA

Thermo[®] debe ser administrado en las dosis y frecuencias determinadas por el Médico Veterinario actuante.

No administrar a animales destinados al consumo humano.

No debe ser manipulado sin guantes.

El contacto con la piel en mujeres puede producir anovulación y trastornos del ciclo menstrual. Las mujeres embarazadas o con sospecha de embarazo deben abstenerse de tomar contacto con el fármaco.

Intoxicación en el hombre: En caso de contacto con la piel, lavarse inmediatamente con abundante agua.

En caso de ingestión involuntaria, NO INDUCIR EL VÓMITO y recurrir en forma rápida al médico con el producto.

CONTRADICCIONES

No administrar a machos. No administrar a hembras con infecciones uterinas (endometritis).

PRESENTACIÓN

Botella x 1000 ml con tapa para aplicar jeringa con dosificación exacta sin desperdicios.

Venta bajo receta archivada.

Información técnica detallada se encuentra a disposición del Médico Veterinario.

CERT. SENASA Nº 07-090

U.REV: 01/2016



CIENCIA Y TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA

LABORATORIO FUNDACION
Avelino Díaz 2535/33
INFO@LABFUNDACION.COM.AR



TEL: 4633-2794/5227
Buenos Aires - Argentina
WWW.LABORATORIOFUNDACION.COM