

CEFTOCIDIN® Endo

F Laboratorio
FUNDACION

SENASA Cert. N° 04-207
Estab. Elab. N° 7112
D.T.M.V G.Ladaga MP5113

CEFTOCIDIN Endo® es un antibiótico tópico para el tratamiento de las infecciones uterinas (endometritis).

INDICACIONES

Ceftocidn Endo® se halla indicado para las infecciones del endometrio tanto en bovinos como en equinos provocadas por gérmenes sensibles, es decir, endometritis subaguda o crónica (hembra repetidora por causa infecciosa) con o sin aparición de secreciones por vulva.

No debe ser usado en metritis o endometritis aguda con volúmenes de colecta superiores a ½ litro (pus, sangre o restos placentarios). En estos casos, debe evacuarse adecuadamente el útero, provocar la escisión correcta del cuerpo lúteo (vía medicamentosa o ginecológica) y recién luego ejecutar el tratamiento.

Ceftocidn Endo® antibiótico tópico para el tratamiento de las infecciones uterinas (endometritis).

Farmacocinética y farmacodinamia:

A) El componente principal, la Cefalexina, es una cefalosporina de amplio espectro, que presenta como características fundamentales:

1. Alta tasa de biodisponibilidad basada en su alta fracción no ionizada, elevada liposolubilidad y baja unión a las proteínas.
2. Es antibiótico bactericida altamente eficaz (potenciado por la sinergia con la Penicilina) contra los patógenos involucrados en las endometritis: *Estreptococos (S. zooepidemicus* y en el Equino), *Arcanobacterium pyogenes*, *Bacillus sp.* y otros anaerobios, *Escherichia coli* y enterobacterias en general (como patógenos del antro uterino) frecuentemente asociados.
3. Se trata de una asociación antibiótica que no crea fácilmente resistencia frente a un uso sostenido y es activo en presencia de pus, sangre y detritus.

B) Procainpenicilina: Antibiótico de muy alta eficacia



contra gérmenes Gram (+), que muestra un marcado sinergismo con la cefalexina (beta - beta) permitiendo la rápida eliminación de la infección.

COMPOSICIÓN

Cada aplicador estéril contiene:

Cefalexina (como monohidrato).....2 g.
Penicilina G Procaína.....2g.
Excipiente oleoso c.s.p.....40 ml.

ADMINISTRACIÓN

Agitese antes de usar.

La dosis tanto para bovinos como equinos es la misma y se aplica 1 inyector intrauterino. Esto corresponde a 40 mililitros totales. Tanto el inyector como el catéter intrauterino son ESTÉRILES, por ello deben seguirse las siguientes indicaciones:

SE AGITA el inyector para lograr la re-suspensión sacándolo de su envoltorio. Se toma el catéter y se coloca por vía vaginal, si es posible sin sacarlo de su envoltorio, siendo guiado por el profesional vía rectal con la otra mano (debidamente enguantada), o a través del vaginoscopio. Al llegar con el catéter al cuello uterino, se perfora el envoltorio con la punta del catéter y se enhebra suavemente el cuello para penetrar dentro del útero.

Una vez colocado, se retira completamente el envoltorio.

Se toma el inyector, se destapa, se encaja el cono por fuera de la punta vaginal del catéter. El

contenido del inyector debe descargarse completamente, pudiéndose aplicar la mitad en cada cuerno. De ser necesario, el tratamiento puede repetirse a las 24 horas. Ello queda a consideración del Médico Veterinario.

EFECTOS COLATERALES

Como resultado de la farmacovigilancia, se han podido identificar en equinos casos con reacción eosinofílica en sangre (valores relativos de 10) y cierto infiltrado uterino, visto por ecografía. En ningún caso se vio comprometida la preñez, teniendo tanto la gestación de la yegua, el parto y la cría una evolución completamente normal.

ADVERTENCIA

El inyector **Ceftocidn Endo®** incluye un excedente que queda dentro de la cánula. Por ello, una vez aplicado, se debe descartar el conjunto debido a que no hay pérdida de dosis. La leche de las vacas tratadas debe desecharse hasta 12 horas luego de la última aplicación. El tiempo de espera antes de enviar a faena es de 10 días posteriores al último tratamiento.

Mantener fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN

Ceftocidn Endo® se presenta en caja conteniendo 12 aplicadores estériles y 12 cánulas intrauterinas estériles anexas.

Venta bajo receta.

Información técnica detallada se encuentra a disposición del Médico Veterinario.



WWW.LABORATORIOFUNDACION.COM

(+54) 11 5940-3012 (+54) 11 4633-2794
 info@labfundacion.com.ar