

PARONHEL-E POLVO



Laboratorio
UNDACION
ciencia y tecnología farmacéutica

Endoparasiticida de amplio espectro para equinos.

ACCIÓN

PARONHEL- E® ejerce su acción en forma ideal, actuando en el 95% de eficacia. Ello lo ubica en un rango ideal, ya que permite conservar una pequeña carga que mantiene la inmunidad del huésped (más importante aún en potrillos), impidiendo infestaciones masivas tan comunes luego del uso sostenido con Ivermectina. La acción es sobre la musculatura del parásito, provocando una contracción sostenida (parálisis espástica).

El mecanismo de acción sería homólogo al del neurotransmisor acetilcolina en su efecto nicotínico, estando centrado su ataque en la unión neuromuscular (placa mioneural). Posiblemente se trate de una unión de tipo irreversible (contraria a la del neurotransmisor), con los receptores nicotínicos colinérgicos ya que su acción es bloqueada al igual que la acetilcolina por la D-tubocurarina (relajante neuromuscular periférico).

INDICACIONES

Para el control eficaz de las siguientes parasitosis, en todos sus estadios:

Nematodos:

*Ascaridiasis: *Parascaris equorum*.

*Estrongilosis: Grandes Estrongilos (*S. vulgaris*; *S. equinus*; *S. edentatus*). Pequeños Estrongilos. u Oxiuros: (*Oxiurus equi*).

Cestodos: *Anaplocephala sp.* y *Paranaplocephala sp.*

PARONHEL- E® es el único antiparasitario que actúa contra *Taenia equinas* en forma efectiva y reproducible.

No crea acostumbramiento, siendo además altamente eficaz contra parásitos resistentes a los bencimidazoles (mebendazole, oxibendazole), probencimidazoles (febantel), fenotiazina y avermectinas.

DOSIFICACIÓN

PARONHEL- E® no se requiere ayuno previo; no interfiere con el trabajo y/o entrenamiento.

Se suministra una medida al ras cada 50 kgpv. (2g/50 kgpv.). Por su agradable sabor y no pulverulencia puede administrarse en la ración. Por el alto coeficiente de dispersión agua, se puede dar por sonda.

La suspensión debe administrarse rápidamente y **NO PUEDE CONSERVARSE NI AÚN REFRIGERADA.**

La eliminación de los escolex de Cestodos se obtiene suministrando **PARONHEL- E®** al doble de la dosis recomendada (4g/50 kpv).

PARONHEL- E® posee un alto margen terapéutico. Es completamente atóxico para la yegua preñada, el semental y el potrillo lactante.

COMPOSICIÓN

Pirantel Pamoato_47.75 g.

Excipiente c.s.p_100 g.

ADVERTENCIA

No es aconsejable el uso concomitante con depresores del sistema nervioso central ni relajantes musculares.



PARONHEL-E[®]
POLVO



Endoparasiticida de amplio espectro para equinos.

Restricciones de uso: Los animales tratados no deben ser destinados a consumo humano.

EFEECTOS COLATERALES

No posee.

PRESENTACIÓN

Envases conteniendo 100 g de polvo. Cinco dosis para 500 kg totales (2500 kg totales), con una medida cada 50 kgpv.

Venta bajo receta.

Información técnica detallada se encuentra a disposición del Médico Veterinario.



www.laboratoriodundacion.com

info@labfundacion.com.ar

TEL: (+54) 11 4633-2794

Avelino Diaz 2535 (1406) | CABA | Argentina