

PARTONHEL E POLVO®

COMPOSICIÓN

- Pirantel Pamoato.....47.75 g.
- Excipiente c.s.p.....100 g.

ACCIÓN

Endoparasiticida de amplio espectro para equinos.

PARONHEL- E® ejerce su acción en forma ideal, actuando en el 95% de eficacia. Ello lo ubica en un rango ideal, ya que permite conservar una pequeña carga que mantienen la inmunidad del huésped (más importante aún en potrillos), impidiendo infestaciones masivas tan comunes luego del uso sostenido con Ivermectina.

La acción es sobre la musculatura del parásito, provocando una contracción sostenida (parálisis espástica).

El mecanismo de acción sería homólogo al del neurotransmisor acetilcolina en su efecto nicotínico, estando centrado su ataque en la unión neuromuscular (placa mioneural). Posiblemente se trate de una unión de tipo irreversible (contraria a la del neurotransmisor), con los receptores nicotínicos colinérgicos ya que su acción es bloqueada al igual que la acetilcolina por la D-tubocurarina (relajante neuromuscular periférico).

INDICACIONES

Para el control eficaz de las siguientes parasitosis, en todos sus estadios:

- Nematodos:
 - Ascariasis: (*Parascaris equorum*).

- Estrongilosis: Grandes Estrongilos (*S. vulgaris*; *S. equinus*; *S. edentatus*). Pequeños Estrongilos.
- Oxiuros: (*Oxiurus equi*).
- **Cestodes:** *Anaplocephala* sp. y *Paranaplocephala* sp.

PARONHEL- E[®] es el único antiparasitario que actúa contra tenías equinas en forma efectiva y reproducible.

No crea acostumbramiento, siendo además altamente eficaz contra parásitos resistentes a los bencimidazoles (mebendazole, oxibendazole), probencimidazoles (febantel), fenotiazina y avermectinas.

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN

PARONHEL- E[®] no se requiere ayuno previo; no interfiere con el trabajo y/o entrenamiento.

Se suministra una medida al ras cada 50 kgpv. (2g/50 kgpv.). Por su agradable sabor y no pulverulencia puede administrarse en la ración. Por el alto coeficiente de dispersión agua, se puede dar por sonda. La suspensión debe administrarse rápidamente y NO PUEDE CONSERVARSE NI AUN REFRIGERADA.

La eliminación de los escolex de Cestodes se obtiene suministrando **PARONHEL- E[®]** al doble de la dosis recomendada (4g/50 kpv).

PARONHEL- E[®] posee un alto margen terapéutico. Es completamente atóxico para la yegua preñada, el semental y el potrillo lactante.

CONTRADICCIONES

No posee.

ADVERTENCIA

No es aconsejable el uso concomitante con depresores del Sistema nervioso central ni relajantes musculares.

Restricciones de uso: Los animales tratados no deben ser destinados a consumo humano.

PRESENTACIÓN

Envases conteniendo 100 g de polvo. Cinco dosis para 500 kg totales (2500 kg totales), con una medida cada 50 kgpv.

Venta bajo receta archivada

Información técnica detallada se encuentra a disposición del Médico Veterinario.

CERT. SENASA Nº 88155

U.REV: 01/2016



CIENCIA Y TECNOLOGÍA FARMACÉUTICA

LABORATORIO FUNDACION
Avelino Díaz 2535/33
INFO@LABFUNDACION.COM.AR



TEL: 4633-2794/5227
Buenos Aires - Argentina
WWW.LABORATORIOFUNDACION.COM